

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO



**Cardizem® SR**  
cloridrato de diltiazem

## FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

*Cápsula de liberação prolongada de 90 mg: embalagem com 20 cápsulas.*

*Cápsula de liberação prolongada de 120 mg: embalagem com 20 cápsulas.*

Via oral.

## USO ADULTO

Cada cápsula de CARDIZEM SR 90 mg contém 90 mg de cloridrato de diltiazem correspondentes a 82,72 mg de diltiazem.

Cada cápsula de CARDIZEM SR 120 mg contém 120 mg de cloridrato de diltiazem correspondentes a 110,29 mg de diltiazem.

Excipientes: nonpareil-103, talco, povidona, etilcelulose, estearato de magnésio, sacarose.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### **AÇÃO DO MEDICAMENTO ou COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

CARDIZEM SR é um medicamento que combate as alterações no ritmo das batidas do coração, a falta de ar e a pressão alta.

### **INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO OU POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?**

- Pressão alta.
- Dor no peito (Angina).
- Veias entupidas (Coronariopatias isquêmicas) com pressão alta e/ou aumento das batidas do coração.

## **RISCOS DO MEDICAMENTO ou QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Contra-indicações**

- Bloqueio sinoatrial.
- Síndrome do nó sinusal, exceto em pacientes usando marcapasso.
- Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau.
- Mau funcionamento do coração (Insuficiência cardíaca descompensada).
- Acentuada diminuição das batidas do coração.
- Alergia à substância ativa.
- Infarto violento do miocárdio com congestão pulmonar.

**Este medicamento é desaconselhado para crianças de 0 a 12 anos.**

### **Advertências**

**Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cuidado em pessoas diabéticas.**

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.**

### **Precauções**

O diltiazem deve ser administrado com cuidado em:

- Pessoas com bloqueio atrioventricular de 1º grau, sendo necessário um acompanhamento clínico constante. O mesmo ocorre nas pessoas com mau funcionamento do coração (insuficiência cardíaca).
- Pessoas com problemas de mau funcionamento do fígado e dos rins (insuficiência hepática ou renal).
- Pessoas idosas, pois a meia-vida dos bloqueadores dos canais de cálcio pode estar aumentada.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **Interações medicamentosas**

O diltiazem e a digoxina quando tomados juntos podem aumentar no sangue a quantidade de digoxina. Se aparecerem sinais de toxicidade, a dose de digoxina deve ser reduzida.

O efeito do diltiazem pode diminuir se for tomado junto com antiinflamatórios não-hormonais, especialmente a indometacina.

Na associação com outros anti-hipertensivos pode ocorrer aumento dos efeitos anti-hipertensivos.

O uso de betabloqueadores pode resultar numa soma de efeitos sobre o funcionamento do coração. Pode ocorrer pressão muito baixa e mau funcionamento do coração (insuficiência cardíaca), principalmente em pessoas com problemas no músculo que envolve o coração.

O diltiazem pode interferir no metabolismo hepático da ciclosporina e da carbamazepina, podendo ocorrer nefrotoxicidade (envenenamento dos rins) e neurotoxicidade, respectivamente.

Se você tomar junto com a cimetidina pode ocorrer elevação das concentrações máximas de diltiazem no sangue.

CARDIZEM SR, se usado junto com anestésicos, pode aumentar os efeitos cardiológicos e circulatórios dos anestésicos. Desta maneira, anestésicos e

medicamentos que anulam a ação do cálcio devem ser cuidadosamente dosados, ao serem tomados juntos.

**Você deve informar ao seu médico ou cirurgião-dentista se está usando algum outro medicamento.**

## **MODO DE USO ou COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Aspecto físico**

CARDIZEM SR 90 mg são cápsulas duras, gravadas em branco na tampa “90 mg” e no corpo “CARDIZEM SR”. A tampa da cápsula é marrom-chocolate e o corpo é marrom-caramelo. Dentro das cápsulas, há pequenos grãos brancos revestidos.

CARDIZEM SR 120 mg são cápsulas duras, gravadas em branco na tampa “120 mg” e no corpo “CARDIZEM SR”. A tampa da cápsula é marrom-chocolate e o corpo é marrom-caramelo. Dentro das cápsulas, há pequenos grãos brancos revestidos.

### **Características organolépticas**

Vide aspecto físico.

### **Dosagem**

A indicação da dose vai depender das necessidades de cada pessoa, podendo variar de 90 mg a 360 mg ao dia.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe a aparência do medicamento.**

**Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.**

**Como usar**

A indicação da dose usual é de 1 cápsula, duas vezes ao dia (180 mg a 240 mg/dia).

**REAÇÕES ADVERSAS ou QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

As reações desagradáveis (adversas) mais freqüentes são: inchaço, dor de cabeça, enjôo, tontura, fraqueza, erupções na pele, problemas no estômago e intestino (distúrbio gastrintestinal), bloqueio atrioventricular.

Outros efeitos também relatados, mas com menor freqüência, são: vermelhidão do rosto, pressão baixa, alteração nas batidas do coração, mau funcionamento do coração, elevação das enzimas do fígado, mau funcionamento dos rins, parada cardíaca, sensação estranha na pele, sono, tremor, aumento da urina (micção), aumento da micção noturna, perda de apetite, vômitos, aumento de peso, feridas na pele e nas mucosas, coceira, sensibilidade à luz, urticária.

**CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE ou O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Procurar socorro médico imediatamente.

Os principais sintomas de uma superdose são: acentuada diminuição das batidas do coração, bloqueio atrioventricular, mau funcionamento do coração (insuficiência cardíaca), pressão muito baixa.

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO ou ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Manter o medicamento em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Proteger da luz e da umidade.

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0367.0062

Farmacêutica responsável: Laura M. S. Ramos – CRF-SP nº6870

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Esta bula é atualizada continuamente. Por favor, proceda à sua leitura antes de utilizar o medicamento.

**Para sua segurança, mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.**

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

Rod. Regis Bittencourt (BR116), km 286

Itapecerica da Serra - SP

CNPJ/MF nº 60.831.658/0021-10

SAC ☎ 0800-7016633

**Indústria Brasileira**

C07-01

2037369005