

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO



**Cardizem<sup>®</sup>**

cloridrato de diltiazem

### FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

*Comprimido de 30 mg:* embalagem com 20 e 50 comprimidos.

*Comprimido de 60 mg:* embalagem com 20 e 50 comprimidos.

Via oral.

### USO ADULTO

Cada comprimido de 30 mg contém 30 mg de cloridrato de diltiazem correspondentes a 27,57 mg de diltiazem.

Cada comprimido de 60 mg contém 60 mg de cloridrato de diltiazem correspondentes a 55,14 mg de diltiazem.

Excipientes: lactose monoidratada, óleo de rícino hidrogenado, macrogol, estearato de magnésio.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### **AÇÃO DO MEDICAMENTO ou COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

CARDIZEM é um medicamento antiarrítmico (que combate as arritmias, ou seja, as alterações no ritmo dos batimentos do coração), antianginoso (contra as anginas, ou seja, dores fortes no peito e falta de ar) e anti-hipertensivo (combate a hipertensão, ou seja, a pressão alta).

CARDIZEM é fácil de ser usado, bem tolerado pelas pessoas e faz efeito gradualmente. Por isso, é melhor do que outros antagonistas do cálcio

(medicamentos que fazem efeito contrário) do cálcio. CARDIZEM faz efeito 3 horas após ser tomado.

### **INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO ou POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?**

- Angina (dores fortes no peito e falta de ar).
- Coronariopatias (problemas nos vasos que irrigam o coração, chamados de coronárias) acompanhadas de aumento das batidas do coração.
- Pressão alta.

### **RISCOS DO MEDICAMENTO ou QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Contra-indicações**

- Síndrome do nó sinusal.
- Bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º graus, exceto em pacientes com marcapasso ventricular em funcionamento.
- Pressão baixa.
- Diminuição acentuada das batidas do coração.

Este medicamento não deve ser usado em crianças menores de 12 anos.

#### **Advertências**

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**CARDIZEM não age rapidamente porque seu princípio ativo, encontrado na matriz do comprimido é liberado aos poucos. Em alguns casos, devido às condições do trato gastrintestinal (estômago e intestino) da pessoa, esta matriz não absorvível pode ser encontrada nas fezes. Isto não prejudica o**

**funcionamento do medicamento, uma vez que o princípio ativo já foi liberado e absorvido.**

### **Precauções**

Usar com cautela e vigilância médica freqüente na insuficiência cardíaca congestiva.

Pode ocorrer, ocasionalmente, hipotensão arterial sintomática (queda de pressão) e dose-dependente.

Em casos raros pode sobrevir elevação reversível das enzimas hepáticas. Recomendam-se cuidados especiais em casos de insuficiência hepática ou renal (problemas do fígado ou dos rins).

Usar com precaução em indivíduos idosos, pois a meia-vida dos bloqueadores dos canais de cálcio pode estar aumentada.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **Interações medicamentosas**

Você pode usar com nitroglicerina debaixo da língua (sublingual) para tratar crises muito fortes de angina (crises anginosas agudas) e com nitratos para prevenir essas crises, embora o tratamento com CARDIZEM, normalmente, já seja suficiente.

Betabloqueadores (medicamentos para controle da pressão alta) e digitálicos podem aumentar os efeitos retardadores da condução AV.

Se tomado ao mesmo tempo com remédio para pressão alta (anti-hipertensivos), deve-se considerar a própria ação anti-hipertensiva do diltiazem e uma possível soma de efeitos. O diltiazem pode aumentar a quantidade de digoxina no sangue se tomado junto com CARDIZEM.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **MODO DE USO ou COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Aspecto físico**

Os comprimidos de CARDIZEM 30 mg são redondos, planos em ambas as faces, lisos, brilhantes e com bordas biseladas.

Os comprimidos de CARDIZEM 60 mg são redondos, planos em ambas as faces, lisos, brilhantes e com bordas biseladas.

### **Características organolépticas**

Vide aspecto físico.

### **Dosagem**

Você deve começar o tratamento com 30 mg, 4 vezes ao dia.

Aumentar as doses aos poucos, de 1 ou de 2 em 2 dias, se for preciso, até chegar a dose certa.

Esta dose varia, em média, de 180 mg a 240 mg ao dia (60 mg, 3 a 4 vezes ao dia). Há pessoas que melhoram muito tomando o mínimo de remédio: 30 mg, 3 a 4 vezes ao dia.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.**

### **Como usar**

Você deve tomar o medicamento 4 vezes ao dia, antes das 3 principais refeições do dia e ao deitar.

## **REAÇÕES ADVERSAS ou QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

Reações freqüentes: inchaço (edema), dores de cabeça (cefaléia), enjoô (náusea), tonturas, manchas ou bolhas formadas na pele (erupções cutâneas), fraqueza, bloqueio AV.

Reações raras: sonolência, insônia e alteração no funcionamento do estômago e intestino (distúrbios gastrintestinais).

## **CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE ou O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Você deve provocar o vômito e procurar socorro médico imediatamente.

Os principais sintomas de uma superdose são: diminuição das batidas do coração, bloqueio atrioventricular (fechamento dos átrios e ventrículos que dão passagem para a circulação do sangue no coração), insuficiência cardíaca (mau funcionamento do coração), hipotensão (pressão muito baixa).

## **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO ou ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve manter o medicamento em temperatura ambiente (15° C a 30° C) e protegê-lo da luz e da umidade.

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0367.0062

Farmacêutica responsável: Laura M. S. Ramos – CRF-SP n° 6870

N° do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Esta bula é atualizada continuamente. Por favor, proceda à sua leitura antes de utilizar o medicamento.

**Para sua segurança, mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

Rod. Regis Bittencourt (BR 116), km 286

Itapecerica da Serra - SP

CNPJ/MF nº 60.831.658/0021-10

SAC ☎ 0800 7016633

**Indústria Brasileira**

C05-01

155495-1

CL 378