

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Pharmaton Kiddi
polivitamínico, cálcio e lisina

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Xarope: frascos com 200 ml, acompanhados de copo-medida.

Via oral

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada 15 ml do xarope contêm:

lisina (cloridrato de lisina)	300,00 mg
vitamina B1 (cloridrato de tiamina)	3,00 mg
vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina)	3,50 mg
vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)	6,00 mg
vitamina D3 (colecalfiferol)	400 UI
vitamina E (acetato de racealfatocoferol)	15,00 mg
vitamina PP (nicotinamida)	20,00 mg
dexpantenol	10,00 mg
cálcio	130,00 mg

(correspondente a 999,9 mg de lactato de cálcio pentaidratado)

Excipientes: sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido ascórbico, sorbitol, aspartamo, acessulfamo de potássio, óleo de rícino polietoxilado, essência de laranja, essência de tangerina, carmelose sódica, edetato dissódico, ácido cítrico monoidratado, ácido fosfórico, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO DO MEDICAMENTO ou COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PHARMATON KIDDI xarope com lisina é uma formulação suíça balanceada com vitaminas, cálcio e lisina.

As vitaminas do complexo B são necessárias para as funções metabólicas normais.

O cálcio é essencial para a formação da massa óssea.

A lisina é um aminoácido essencial, importante para a formação óssea, além de colaborar na formação de colágeno e proteínas, entre outras funções.

Por se tratar de um polivitamínico e polimineral, não se pode determinar com precisão seu tempo de início de ação, devendo o medicamento ser utilizado pelo tempo necessário para corrigir ou prevenir eventuais deficiências nas situações onde o medicamento está indicado.

INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO ou POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

PHARMATON KIDDI xarope com lisina é indicado em períodos de necessidade aumentada de vitaminas e do aminoácido essencial lisina, especialmente durante o período de crescimento.

Pode ser usado no tratamento preventivo nos casos de deficiência de vitaminas, por exemplo, nas dietas restritas, na convalescença, após cirurgias, doenças infecciosas ou outras patologias.

RISCOS DO MEDICAMENTO ou QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações

PHARMATON KIDDI xarope é contra-indicado nos casos de hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula.

Também está contra-indicado em distúrbios metabólicos existentes de cálcio, como hipercalcemia (nível sanguíneo de cálcio aumentado) e hipercalciúria (eliminação urinária aumentada de cálcio), em casos de hipervitaminose D, na presença de

insuficiência renal, quando administrado com outros produtos contendo vitamina D e em casos de fenilcetonúria.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária de 0 a 1 ano.

Advertências

PHARMATON KIDDI xarope com lisina contém 3.750 mg de sorbitol na dose diária máxima recomendada de 15 ml.

Pacientes com problemas hereditários de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Precauções

Nas doses recomendadas, nenhum outro cuidado especial ou precaução é necessário.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas

PHARMATON KIDDI xarope com lisina é formulado especialmente para crianças. Desconhecem-se efeitos na habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas.

Gravidez e lactação

O uso de PHARMATON KIDDI xarope com lisina por mulheres grávidas ou lactantes deve ser decidido pelo médico, de acordo com a experiência clínica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações Medicamentosas

Até o momento não há relatos de interações com outras drogas ou alimentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

MODO DE USO ou COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico

PHARMATON KIDDI xarope é um líquido viscoso, límpido, de coloração amarela-alaranjada.

Características organolépticas

PHARMATON KIDDI xarope possui um odor como o de laranja e sabor de doce de laranja.

Dosagem

Crianças de 1 a 5 anos: 7,5 ml por dia.

Crianças com idade superior a 5 anos, adolescentes e adultos: 15 ml por dia.

Como usar

Agite bem o frasco antes de utilizar o medicamento.

A quantidade do xarope deve ser medida com o copo-medida incluído na embalagem.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina deve ser ingerido, por via oral, preferencialmente de ½ a 1 hora antes do café-da-manhã ou do almoço.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina também pode ser diluído com água ou sucos, ou misturado com alimentos e papinhas.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina contém sorbitol, aspartamo e acesulfamo de potássio como agentes adoçantes, com aroma de laranja.

PHARMATON KIDDI xarope pode apresentar uma turvação natural devida a alguns excipientes, a qual, entretanto, não prejudica a eficácia do medicamento.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS ou QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Desconhecem-se reações adversas.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE ou O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Sintomas

Após ingestão de altas doses pode resultar um efeito tóxico devido à toxicidade da vitamina lipossolúvel D.

A ingestão diária prolongada de quantidades maiores que 75 ml do produto, pode causar sintomas de toxicidade crônica tais como vômitos, dor de cabeça, sonolência e diarreia. Os sintomas agudos somente são observados com doses ainda mais elevadas. Em adultos, a dose tóxica aguda de vitamina D corresponde, aproximadamente, à ingestão de 25.000-50.000 UI (contidas em 937 – 1.875 ml).

Tratamento

Em caso de superdose acidental, procure orientação médica. Não há antídoto específico.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO ou ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Uma nutrição mal-balanceada ou deficiente pode não fornecer toda a quantidade de vitaminas e minerais necessária às crianças.

As vitaminas e os minerais corrigem e previnem as repercussões danosas sobre o metabolismo celular nas situações de demanda aumentada ou devidas a uma dieta inadequada.

Baixo suprimento de vitaminas, minerais e do aminoácido lisina pode causar distúrbios como debilidade, cansaço, diminuição do apetite e vitalidade, resistência reduzida e prolongamento do tempo de convalescença. As vitaminas do complexo B são necessárias para as funções metabólicas normais.

O cálcio é essencial para a formação da massa óssea. Ele é fornecido principalmente pelo leite e seus derivados.

A lisina é um aminoácido essencial, importante para a formação óssea, além de colaborar na formação de colágeno e proteínas, entre outras funções. Demonstrou-se por estudo clínico que, associada à vitamina D, a lisina proporciona aumento da absorção intestinal de cálcio. É também o aminoácido que mais freqüentemente é consumido de forma inadequada pelas crianças.

INDICAÇÕES

PHARMATON KIDDI xarope com lisina está indicado em períodos de necessidade aumentada de vitaminas e do aminoácido essencial lisina, especialmente durante o período de crescimento.

Pode ser usado como preventivo de deficiência de vitaminas, por exemplo, nas dietas restritas, na convalescença, após cirurgias, doenças infecciosas ou outras patologias.

CONTRA-INDICAÇÕES

PHARMATON KIDDI xarope com lisina é contra-indicado nos casos de hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula.

Também está contra-indicado em distúrbios metabólicos existentes de cálcio, como hipercalcemia e hipercalcúria, em casos de hipervitaminose D, na presença de insuficiência renal, quando administrado com outros produtos contendo vitamina D e em caso de fenilcetonúria.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

Agite bem o frasco antes de utilizar o medicamento.

A quantidade do xarope deve ser medida com o copo-medida incluído na embalagem.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina deve ser ingerido, por via oral, preferencialmente de ½ a 1 hora antes do café-da-manhã ou do almoço.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina também pode ser diluído com água ou sucos, ou misturado com alimentos e papinhas.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina contém sorbitol, aspartamo e acesulfamo de potássio como agentes adoçantes, com aroma de laranja.

PHARMATON KIDDI xarope pode apresentar uma turvação natural devida a alguns excipientes, a qual, entretanto, não prejudica a eficácia do medicamento.

POSOLOGIA

Crianças de 1 a 5 anos: 7,5 ml por dia.

Crianças com idade superior a 5 anos, adolescentes e adultos: 15 ml por dia.

ADVERTÊNCIAS

PHARMATON KIDDI xarope com lisina contém 3.750 mg de sorbitol na dose diária máxima recomendada de 15 ml.

Pacientes com problemas hereditários de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento.

Nas doses recomendadas, nenhum outro cuidado especial ou precaução é necessário.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas

PHARMATON KIDDI xarope com lisina é formulado especialmente para crianças. Desconhecem-se efeitos na habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas.

Gravidez e lactação

O uso de PHARMATON KIDDI xarope com lisina por mulheres grávidas ou lactantes deve ser decidido pelo médico, de acordo com a experiência clínica.

PHARMATON KIDDI xarope com lisina está classificado na categoria de risco B na gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

Desconhecem-se restrições especiais para o uso do produto em pacientes com idade acima de 65 anos.

Este medicamento é contra-indicado na faixa etária de 0 a 1 ano.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não há relatos de interações com outras drogas ou alimentos.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Desconhecem-se reações adversas.

SUPERDOSE

Sintomas

Após ingestão de altas doses pode resultar um efeito tóxico devido à toxicidade da vitamina lipossolúvel D.

A ingestão diária prolongada de quantidades maiores que 75 ml do produto pode causar sintomas de toxicidade crônica tais como vômitos, dor de cabeça, sonolência e diarreia. Os sintomas agudos somente são observados com doses ainda mais elevadas. Em adultos, a dose tóxica aguda de vitamina D corresponde, aproximadamente, à ingestão de 25.000-50.000 UI (contidas em 937 – 1.875 ml).

Tratamento

Em caso de superdose acidental, tomar as medidas habituais de suporte.

ARMAZENAGEM

Manter o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.0367.XXXX

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Esta bula é atualizada continuamente. Por favor, proceda à sua leitura antes de utilizar o medicamento.

Para sua segurança, mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.

PHARMATON® NATURAL HEALTH PRODUCTS

Fabricado e embalado por: Ginsana SA

Lugano-Bioggio/Suíça

Importado por:

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

Resp. Técn.: Farm. Laura M. Spinosa Ramos - CRF-SP nº 6870

Rod. Regis Bittencourt (BR 116), km 286 - Itapequerica da Serra - SP

SAC - 0800-7016633
CNPJ/MF nº 60.831.658/0021-10

BPI 0240-04 29062006
L09-01