

ENTERISOL ILEITIS
Lawsonia intracellularis
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM. E FARMACÊUTICA

Fórmula:

L. intracellularis ≥ 5.2 TCID₅₀ por dose.

Indicações:

E recomendada para a vacinação de suínos saudáveis e susceptíveis com 3 semanas ou mais de idade como um auxílio na prevenção de enteropatia proliferativa suína (ileite) causada por *Lawsonia intracellularis*.

Dosagem:

2mL da vacina via oral por animal.

Administração:

Reconstituir a vacina com todo o conteúdo do diluente. Agite bem e use imediatamente.

Vacinação via água de bebida - Bebedouro tradicional:

1. Reconstituir a vacina somente no momento da vacinação.
2. Remover toda a medicação, desinfetante ou outro produto da água 72 horas (3 dias) antes da aplicação da vacina.
3. Deixe correr água limpa não tratada para eliminar qualquer agente antibacteriano.
4. Reconstitua a vacina com o diluente do produto.
5. Adicionar 2mL da vacina reidratada ao depósito de água limpa para cada animal a ser vacinado. (ver tabela).
6. A solução final contendo a vacina deve ser consumida em até 4 horas após a reidratação da vacina.

Vacinação via água de bebida - Bebedouro automático:

1. Reconstituir a vacina somente no momento da vacinação.
2. Remover toda a medicação, desinfetante ou outro produto da água 72 horas (3 dias) antes da aplicação da vacina.
3. Providenciar bebedouros suficientes para que todos os animais possam beber durante 4 horas.
4. Deixe correr água limpa não tratada para eliminar qualquer agente antibacteriano.

5. Regular o dosador para fornecer 30mL da vacina reidratada para cada 4 litros de água.
6. Veja na tabela a quantidade de vacina por animal.
7. Prepare o concentrado de vacina conforme segue:
 - a) Reidratar a vacina com o diluente.
 - b) Colocar a quantidade de doses num recipiente apropriado para estocar a vacina igual ou superior ao número de animais a vacinar.
 - c) Adicionar a quantidade apropriada de água limpa, não tratada ao recipiente. Misturar bem.
8. Inserir o tubo dosador no concentrado de vacina e iniciar o fluxo de água. Continuar até consumir totalmente o concentrado de vacina, antes de trocar o suprimento de água para o fluxo direto. Não medicar ou empregar desinfetantes por pelo menos 3 dias após a vacinação.

Peso total dos suínos (kg) (nº de animais x peso médio	Bebedouro convencional – Consumo de água em 4 horas¹	Bebedouro automático²
50	700mL	5mL
100	1,4litros	10mL
150	2,1litros	15mL
200	2,8litros	20mL
250	3,5litros	25mL
300	4,2litros	30mL
350	4,9litros	35mL
400	5,6litros	40mL
450	6,3litros	45mL
500	7,0litros	50mL

¹ Consumo estimado de 700mL para cada 50kg de peso corpóreo no período de 4 horas.

² Valores para suínos de 20kg ou mais. O aparelho dosador é regulado para fornecer 30mL de vacina reconstituída para cada 4 litros de água.

Precauções:

Suínos bebem em geral 8% a 112% de seu peso corpóreo por dia, dependendo das condições de temperatura locais. Agitar bem antes de usar. Uma vez aberto o frasco utilizar todo o conteúdo.

Não vacinar os animais no período de 21 dias antes do abate. Podem ocorrer reações anafilactoides, neste caso administrar epinefrina como antídoto. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Queimar e enterrar os frascos apos o uso. Não vacinar animais enfermos, subnutrido, parasitados ou sob condições de estresse. Não utilizem em fêmeas gestantes ou machos não castrados. A vacina não deve ser utilizada junto com antibióticos ou anti-inflamatórios. Todos os materiais utilizados na administração desta vacina devem estar livres de antibióticos e resíduos de desinfetantes para prevenir a inativação ou redução da eficácia do produto. Quando a vacinação for feita via agua de bebida, remova toda a medicação, sanitizantes e desinfetantes da agua de bebida por pelo menos 3 dias antes e 3 dias apos a vacinação. Quando a vacinação for realizada através da agua de bebida, a solução final contendo vacina deve ser consumida ate 4 horas apos a reconstituição da vacina.

Apresentação:

Frascos de 10, 50 ou 100 doses, acompanhados dos respectivos frascos de diluente (20mL, 100mL e 200mL).

Classe Terapêutica:

VACINAS, CORANTES E DILUENTES (BIOLÓGICOS)

Princípio(s) Ativo(s):

VAC. VIVA CONTRA LAWSONIA INTRACELLULARIS

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

9008/2004

Responsável Técnico:

Simone R. V. Farah - CRMV: 10.783

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800 888 5870

Declaramos para os devidos fins que todas as informações prestadas aqui são de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário do produto.